

NOTE TO SUPPLIER: REPEAT PAGE IS USED

- SPoPT4 – O aplicador deverá usar: luvas, vestuário de proteção e máscara respiratória durante a preparação da calda e aplicação do produto.
- SPoPT5 – Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.



SU AGI Code: 78236
Mod.: 140824

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Detentor da Autorização de Venda: Mitsui AgriScience International SA/NV
Avenue de Tervueren, 270 – 1150 Brussels, Belgium
Tel: +32 (2776) 8491 / Fax: +32 (2776) 8340

Distribuído por: Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ld°
Av. D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso – 1990-079 Lisboa
Tel. 21 794 32 00 / www.syngenta.pt

Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65



Insecticida biológico para controlo de lagartas de lepidópteros

Grânulos dispersíveis (WG) contendo 850 g/kg (90000 IU/mg) de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* estirpe SA-12

O produto pode ser usado em Modo de Produção Biológico

OS MICRORGANISMOS PODEM TER O POTENCIAL PARA PROVOCAR REAÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS À SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANter FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

Autorização de venda nº 1238, concedida pela DGAV

Data de produção e Lote nº: (ver na embalagem)

® O nome Costar é marca registada da Certis U.S.A. L.L.C.

500 g

ALLIANCE FRAME, Logo SYNGENTA e PURPOSE ICON são marcas registadas da Syngenta Group Company



BRAND DGO/NAME®
WG

syngenta

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS:

Para melhorar a eficácia do produto, garanta uma boa pulverização da vegetação de modo a atingir todos os órgãos a proteger. A aplicação deve ser efetuada nas horas de menor calor (princípio da manhã ou final da tarde). Não efetuar misturas com produtos de reação alcalina, procedendo à correção da água se necessário.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS:

- P101 – Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
- P103 – Ler atentamente e seguir todas as instruções.
- P260 – Não respirar as poeiras e a nuvem de pulverização.
- P262 – Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
- P270 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- P333+P313 – Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- P501a – Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- EUH210 – Ficha de segurança fornecida a pedido.
- SP1 – Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
- SPgPT4 – Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Por favor, eliminar antes de imprimir.

L1124842 PORT/09C PPE 4216131

L1124842 PORT/09C PPE 4216131

20mm BOOKLET SPINE SHOULD BE KEPT VARNISH FREE

DESCRIPTION:
BOOKLET Trt 4 - 20 pg 268 x 90 MM - GPD

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN005

ISSUE DATE:
02.02.2024

4114431

SU AGI Code: 78236

O **CoStar® WG** é um inseticida constituído por uma preparação constituída por esporos e cristais de endotoxinas de *Bacillus thuringiensis* ssp. *Kurstaki*, estirpe SA-12, para controlo de lagartas jovens de lepidópteros. Atua por ingestão, afetando o trato gastrointestinal provocando uma infeção generalizada, com a paralisia geral das lagartas impossibilitando-as de se alimentarem e, posteriormente, levando-as à morte. Pertence ao grupo 11 (IRAC) disruptores microbianos das membranas intestinais dos insetos.

O **CoStar® WG** é indicado para combater o aparecimento das pragas indicadas nas culturas mencionadas abaixo: Sempre que possível faça tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Cultura	Praga	Dose (Kg/ha) ou concentração(Kg/hL)/ volume de calda (L/ha)	Nº de aplicações por ciclo cultural	Condições de utilização
Laranjeira, Limoeiro	Traça-do-limoeiro (<i>Prays citri</i>)	0,05-0,1 Kg/hL/1000-1500 L/ha (dose máxima 1,5 kg/ha)	2 – 6*	Desde o fim da floração até à colheita (BBCH 67-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Macieira, Pereira, Nespereira	Bichado-da-fruta (<i>Cydia pomonella</i>)	0,05-0,1 Kg/hL/1000-1500 L/ha (dose máxima 1,5 kg/ha)	2 – 6*	Desde o fim da floração até à colheita (BBCH 67-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Macieira	Hiponomeuta-da-macieira (<i>Yponomeuta malinellus</i>)	0,05-0,1 Kg/hL/1000-1500 L/ha (dose máxima 1,5 kg/ha)	2 – 6*	Desde o fim da floração até à colheita (BBCH 67-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Pessegueiro, Nectarina, Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro)	Traça-oriental-do-pessegueiro (<i>Grapholita molesta</i>), Anársia (<i>Anarsia lineatella</i>)	0,075-0,1 Kg/hL/1000-1500 L/ha (dose máxima 1,5 kg/ha)	2 – 6*	Desde o fim da floração até à colheita (BBCH 67-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Cerejeira	Traça (<i>Operophtera brumata</i>)	0,075-0,1 Kg/hL/1000-1500 L/ha (dose máxima 1,5 kg/ha)	2 – 6*	Desde o fim da floração até à colheita (BBCH 67-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Ameixeira	Bichado-das-ameixas (<i>Cydia funebrana</i>) Hiponomeuta-da-ameixeira (<i>Yponomeuta padella</i>)	0,075-0,1 Kg/hL/1000-1500 L/ha (dose máxima 1,5 kg/ha)	2 – 6*	Desde o fim da floração até à colheita (BBCH 67-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).

-12, das
rais

1ça
is

1ça
is

1ça
is

1ça
is

1ça
is

1ça
is

Cultura	Praga	Dose (Kg/ha) ou concentração(Kg/hL)/ volume de calda (L/ha)	Nº de aplicações por ciclo cultural	Condições de utilização
Oliveira	Traça-da-oliveira (<i>Prays oleae</i>)	0,05-0,1 Kg/hL/1000-1500 L/ha (dose máxima 1,5 kg/ha)	2 – 6*	Desde o fim da floração até à colheita (BBCH 69-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Videira	Traças-dos-cachos (<i>Lobesia botrana</i> , <i>Eupoecilia ambiguella</i>)	0,05-0,1 Kg/hL/1000-1500 L/ha (dose máxima 1,5 kg/ha)	2 – 6*	Desde o fim da floração até à colheita (BBCH 69-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Morangueiro (ar livre e cultura protegida)	Lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>), Lagartas (<i>Spodoptera</i> sp.)	0.3 – 1 Kg/ha/1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita (BBCH 12-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Tomateiro, Pimenteiro, Beringela (ar livre e cultura protegida)	Lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>), Lagartas (<i>Spodoptera</i> sp.) Nóctua-cinzenta (<i>Agrotis segetum</i>)	0.3 – 1 Kg/ha/200 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita (BBCH 12-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Tomateiro (ar livre e cultura protegida)	Traça-do-tomateiro (=tuta) (<i>Tuta absoluta</i>)	0.3 – 1 Kg/ha/200 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita (BBCH 12-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Melancia, Meloeiro, Aboborinha (="courgette"), Abóbora (abóbora- -porqueira), Pepino (ar livre e cultura protegida)	Nóctuas (<i>Autographa gamma</i> , <i>Agrotis ipsilon</i>) Lagarta (<i>Spodoptera littoralis</i>) Lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>) Nóctua-cinzenta (<i>Agrotis segetum</i>)	0.3 – 1 Kg/ha/200 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita (BBCH 12-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Couve-flor, Couve-bróculo, Couve- -repolho, Couve-coração, Couve- -roxa, Couve-lombarda, Couve- -portuguesa (inclui couve-tronchuda e couve-penca), Couve-galega (ar livre)	Nóctua-da-couve (<i>Mamestra brassicae</i>) Lagartas e nóctuas (<i>Spodoptera</i> sp., <i>Agrotis</i> sp.) Traça-da-couve (<i>Plutella xylostella</i>) Lagartas-da-couve (<i>Pieris</i> sp.)	0.3 – 1 Kg/ha/200 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita (BBCH 12-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Rabanete (= rábano) (ar livre e cultura protegida)	Lagartas (=roscas ou nóctuas) (<i>Agrotis</i> sp.)	0.5 – 1 Kg/ha/500 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita (BBCH 12-49), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).

Cultura	Praga	Dose (Kg/ha) ou concentração(Kg/hL)/ volume de calda (L/ha)	Nº de aplicações por ciclo cultural	Condições de utilização
Alface, Espinafre, Acelga, Salsa, Cebolinho (ar livre e cultura protegida)	Lagartas e nóctuas (<i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Agrotis</i> sp.)	0.3 – 1 Kg/ha/500 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita (BBCH 12-49), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Alho-porro (=alho-francês), Aipo (ar livre e cultura protegida)	Lagartas e nóctuas (<i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Agrotis</i> sp.)	0.5 – 1 Kg/ha/500 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita (BBCH 12-49), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Feijoeiro, Feijoeiro para consumo em fresco (vagem, feijão-verde) (ar livre)	Lagartas e nóctuas (<i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Agrotis</i> sp.), Lagarta-do-feijão (<i>Etiella zinckenella</i>)	0.75 – 1 Kg/ha/500 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita (BBCH 12-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Ervilhira, Faveira, Colza (ar livre)	Lagartas e nóctuas (<i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Agrotis</i> sp.)	0.75 – 1 Kg/ha/500 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas até à colheita, em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Alcachofra (ar livre)	Lagartas e nóctuas (<i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Agrotis</i> sp.), Lagarta-da-alcachofra (<i>Agonopterix subpropinqua</i>)	0.75 – 4 Kg/ha/500 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas até à maturação, em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Batateira	Traça-da-batata (<i>Phthorimaea operculella</i>), Lagartas (=roscas ou nóctuas) (<i>Agrotis</i> sp.)	0.5 – 1 Kg/ha/500 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita do tubérculo (BBCH 12-90), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Milho	Piral-do-milho (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	0.5 – 1 Kg/ha/500 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita (BBCH 12-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Beterraba-sacarina (=beterraba-açucareira)	Lagartas e nóctuas (<i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Agrotis</i> sp.)	0.5 – 1 Kg/ha/500 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita (BBCH 12-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Tabaco	Lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>), Lagartas (=roscas ou nóctuas) (<i>Agrotis</i> sp.)	0.5 – 1 Kg/ha/500 – 1000 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita (BBCH 12-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).

Cultura	Praga	Dose (Kg/ha) ou concentração(Kg/hL)/ volume de calda (L/ha)	Nº de aplicações por ciclo cultural	Condições de utilização
Algodoeiro	Lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>), Lagartas (=roscas ou nóctuas) (<i>Agrotis</i> sp.)	0,5 – 1 Kg/ha/500 – 800 L/ha	2 – 6*	Desde o desenvolvimento das folhas (2ª folha) até à colheita (BBCH 12-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Castanheiro	Bichado-da-castanha (<i>Cydia splendana</i>)	0,1-0,15 Kg/hL/500- 1000 L/ha (dose máxima 1,5 kg/ha)	2 – 6*	Desde o desenvolvimento do fruto até à colheita (BBCH 70-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Bananeira	Traça-da-bananeira (=traça-da-cana) (<i>Opogona sacchari</i>)	0,03 – 0,07 Kg/hL/1000 – 1500 L/ha (dose máxima 1,05 kg/ha)	3 – 4	Desde o desenvolvimento do fruto até à colheita (BBCH 70-89), em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Pinheiro	Processionária-do-pinheiro (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)	0,1 Kg/hL/1000 – 1500 L/ha (dose máxima 1,5 kg/ha)	2 – 6*	Em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Sobreiro, Azinheira	Limântria (=lagarta-do-sobreiro) (<i>Lymantria dispar</i>)	0,1 Kg/hL/1000 – 1500 L/ha (dose máxima 1,5 kg/ha)	2 – 6*	Em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).
Relvados	Lagartas e nóctuas (<i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Agrotis</i> sp.)	1 – 1.5 Kg/ha 1000 -1500 L/ha	2 – 6*	Em presença da praga. Preferencialmente à eclosão dos ovos ou em lagartas jovens (nos primeiros instares).

* Seguir o n.º máximo de aplicações indicado na tabela, respeitando o intervalo **mínimo de 1 semana** entre aplicações. Pode voltar a efetuar o mesmo número de tratamentos desde que interrompa a aplicação deste produto durante 4 semanas seguidas.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS:

Para melhorar a eficácia do produto, garanta uma boa pulverização da vegetação de modo a atingir todos os órgãos a proteger. A aplicação deve ser efetuada nas horas de menor calor (princípio da manhã ou final da tarde). Não efetuar misturas com produtos de reação alcalina, procedendo à correção da água se necessário.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA:

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO:

Para aplicação com barra de pulverização em culturas baixas:

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda.

A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Para aplicação em culturas arbustivas e arbóreas:

Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS:

• P101 – Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. • P103 – Ler atentamente e seguir todas as instruções. • P260 – Não respirar as poeiras e a nuvem de pulverização. • P262 – Não pode entrar em contacto com os olhos a pele ou a roupa. • P270 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. • P333+P313 – Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. • P501a – Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • EUH210 – Ficha de segurança fornecida a pedido. • SP1 – Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas. • SPgPT4 – Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. • SPoPT4 – O aplicador deverá usar: luvas, vestuário de proteção e máscara respiratória durante a preparação da calda e aplicação do produto. • SPoPT5 – Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



- SPoPT4 – O aplicador deverá usar: luvas, vestuário de proteção e máscara respiratória durante a preparação da calda e aplicação do produto.
- SPoPT5 – Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.



SU AGI Code: 78236
Mod.: 140824



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Detentor da Autorização de Venda: Mitsui AgriScience International SA/NV
Avenue de Tervueren, 270 – 1150 Brussels, Belgium
Tel: +32 (2776) 8491 / Fax: +32 (2776) 8340

Distribuído por: Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ld^a
Av. D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso – 1990-079 Lisboa
Tel. 21 794 32 00 / www.syngenta.pt

Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65



Costar® WG

syngenta®

Insecticida biológico para controlo de lagartas de lepidópteros

Grânulos dispersíveis (WG) contendo 850 g/kg (90000 IU/mg) de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* estirpe SA-12

O produto pode ser usado em Modo de Produção Biológico

OS MICRORGANISMOS PODEM TER O POTENCIAL PARA PROVOCAR REAÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL PARA EVITAR RISCOS À SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

Autorização de venda nº 1238, concedida pela DGAV
Data de produção e Lote nº: (ver na embalagem)
® O nome Costar é marca registada da Certis U.S.A. L.L.C.

500 g

ALLIANCE FRAME, Logo SYNGENTA e PURPOSE ICON são marcas registadas da Syngenta Group Company

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS:

Para melhorar a eficácia do produto, garanta uma boa pulverização da vegetação de modo a atingir todos os órgãos a proteger. A aplicação deve ser efetuada nas horas de menor calor (princípio da manhã ou final da tarde). Não efetuar misturas com produtos de reação alcalina, procedendo à correção da água se necessário.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS:

- P101 – Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
- P103 – Ler atentamente e seguir todas as instruções.
- P260 – Não respirar as poeiras e a nuvem de pulverização.
- P262 – Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
- P270 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- P333+P313 – Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- P501a – Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- EUH210 – Ficha de segurança fornecida a pedido.
- SP1 – Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
- SPgPT4 – Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

GLUE PAGE

PAGE NUMBER SEQUENCING IS DETERMINED BY THE FINAL LEADING EDGE.
RIGHT HAND STARTS FROM BACK OF BOOKLET. LEFT HAND STARTS FROM FRONT OF BOOKLET.
FIRST (FRONT) PAGE IS ALWAYS FIXED ON TOP OF BOOKLET.

BASE
NON PRINTABLE