Modulo 1 – Química Orgânica

3. Reações e mecanismos reacionais das moléculas orgânicas

Tipos de reações: reações de substituição, adição, eliminação e rearranjo (transposição)

Reações heterolíticas

Reações homolíticas

Eletrófilos e nucleófilos

Efeito indutor (atrativo e repulsivo)

Propagação do efeito indutor

Formação de carbocatiões e carboaniões, estabilidade

Tipos de reações:

- substituição,
- adição,
- eliminação,
- reorganização (rearranjo ou transposição)

Classificação das reações em termos de balanço global

-comparação entre as estruturas de reagentes e de produtos

As reações ocorrem por mecanismos reacionais diferentes

Reações de substituição:

Substituição de 1 átomo, ou grupos substituintes por outro na molécula inicial

Reações características de compostos saturados

Reações de Adição:

Uma molécula de um composto é incorporada noutra molécula

Reações características de compostos com ligações duplas e triplas (alcenos, alcinos)

Reações de Eliminação:

Uma molécula perde alguns dos seus átomos, resultando uma ligação múltipla (oposto à adição)

Método de síntese de compostos insaturados por desidrogenação

Reações de Reorganização (rearranjo, transposição):

Uma molécula sofre reorganização de alguns dos seus átomos ou grupos constituintes, que mudam de posição na molécula

Obtêm-se isómeros estruturais de posição

Rupturas homolíticas (ou radicalares)

Formação de radicais: $(XY \rightarrow X\cdot + Y\cdot)$

Rutura da ligação com partilha simétrica do par de eletrões

Formação de 2 radicais livres: **grupo com um eletrão ímpar, e sem carga elétrica**

As ligações quebradas são essencialmente ligações sigma (C-C e C-H)

Os átomos com um eletrão têm défice eletrónico, são pouco estáveis.

Ruturas heterolíticas

Formação de **carboaniões**:

- Ocorrem entre espécies com eletronegatividade diferente numa ligação covalente polarizada
- Ligação tipo C-Z (em que Z é átomo diferente de C)
- Se Z é **menos** eletronegativo que C forma-se um **carboanião**:

Formação de carboaniões:

Exemplo: $\text{H}_3\text{C} - \text{Na}$

Exemplo:

alcinos terminais

(resulta de $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{C}-\text{Na}$)

Ruturas heterolíticas

Formação de **carbocatiões**:

- Ocorrem entre espécies com eletronegatividade diferente numa ligação covalente polarizada
- Ligação tipo C–Z (em que Z é átomo diferente de C)
- Se Z é **mais** eletronegativo que C forma-se um **carbocatião**

Exemplo: derivado halogenado

Carboaniões e carbocatiões

são formas reativas intermédias que resultam de **rupturas heterolíticas** ou polares:

- São iões, com carga elétrica positiva e negativa localizada no C (catiões e aniões)
- Ocorre em ligações covalentes polarizadas do tipo C-X, com partilha não simétrica do par de eletrões
- Ruptura heterolítica é tanto mais fácil quanto maior o momento dipolar (μ) da ligação.

Ácidos e bases, teoria de Bronsted-Lowry

Um ácido de Bronsted-Lowry é um dador de protões, (tem que conter H⁺)

Uma base de Bronsted-Lowry é um aceitador de protões (tem que conseguir ligar-se ao H⁺)

Common Brønsted–Lowry Acids

HCl
hydrochloric acid

H₂SO₄
sulfuric acid

HBr
hydrobromic acid

HNO₃
nitric acid

acetic acid
a carboxylic acid

Common Brønsted–Lowry Bases

$\ddot{\text{N}}\text{H}_3$
ammonia

NaOH
sodium hydroxide

Mg(OH)₂
magnesium hydroxide

H₂ $\ddot{\text{O}}$:
water

KOH
potassium hydroxide

Ca(OH)₂
calcium hydroxide

Lone pairs make these neutral compounds bases.

⁻OH is the base in each metal salt.

A água é uma substância anfotérica:

H₂O as a base

H₂O as an acid

$$K_w \text{H}_2\text{O} = 10^{-14}, \text{ isto é, } [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

O ácido acético é um ácido fraco -não se dissocia totalmente como ácido

$$K_a = 1.8 \times 10^{-5}$$

Ácidos e bases, teoria de Lewis

Um ácido de Lewis é um aceitador de eletrões

Uma base de Lewis é um dador de eletrões

São ácidos de Lewis:

- Catiões
- Elementos com uma orbital vazia

São bases de Lewis:

- aniões
- Elementos com pares de eletrões livres

As duas teorias são coincidentes:

A espécie que recebe prótons (base de Bronsted-Lowry) é a mesma de cede electrões (base de Lewis)

Se captar o próton, reage como base (:B):

Base:

- porque capta H^+
- porque cede e^-

Ácido:

- porque dá H^+
- porque recebe e^-

Caráter ácido é influenciado pela polarização da ligação:

A posição dos elementos na Tabela Periodica determina a força dos ácidos

Em colunas:

Aumento da acidez

Aumento da basicidade

1	H	1
2	He	2
3	Li	3
4	Be	4
5	B	5
6	C	6
7	N	7
8	O	8
9	F	9
10	Ne	10
11	Na	11
12	Mg	12
13	Al	13
14	Si	14
15	P	15
16	S	16
17	Cl	17
18	Ar	18
19	K	19
20	Ca	20
21	Sc	21
22	Ti	22
23	V	23
24	Cr	24
25	Mn	25
26	Fe	26
27	Co	27
28	Ni	28
29	Cu	29
30	Zn	30
31	Ga	31
32	Ge	32
33	As	33
34	Se	34
35	Br	35
36	Kr	36
37	Rb	37
38	Sr	38
39	Y	39
40	Zr	40
41	Nb	41
42	Mo	42
43	Tc	43
44	Ru	44
45	Rh	45
46	Pd	46
47	Ag	47
48	Cd	48
49	In	49
50	Sn	50
51	Sb	51
52	Te	52
53	I	53
54	Xe	54
55	Ba	55
56	La	56
57	Ce	57
58	Pr	58
59	Nd	59
60	Pm	60
61	Sm	61
62	Eu	62
63	Gd	63
64	Tb	64
65	Dy	65
66	Ho	66
67	Er	67
68	Tm	68
69	Yb	69
70	Lu	70
71	Hf	71
72	Ta	72
73	W	73
74	Re	74
75	Os	75
76	Ir	76
77	Pt	77
78	Au	78
79	Hg	79
80	Tl	80
81	Pb	81
82	Bi	82
83	Po	83
84	At	84
85	Rn	85
86	Fr	86
87	Ra	87
88	Ac	88
89	Th	89
90	Pa	90
91	U	91
92	Np	92
93	Pu	93
94	Am	94
95	Cm	95
96	Bk	96
97	Cf	97
98	Es	98
99	Fm	99
100	Md	100
101	Ds	101
102	Dt	102
103	Nh	103
104	Fl	104
105	Mc	105
106	Lv	106
107	Ts	107
108	Og	108

A posição na Tabela Periodica determina a força dos ácidos:

13	IIIA	14	IVA	15	VA	16	VIA	17	VIIA	HELIUM	
5	10.811	6	12.011	7	14.007	8	15.999	9	18.998	10	20.180
	B		C		N		O		F		Ne
	BORON		CARBON		NITROGEN		OXYGEN		FLUORINE		NEON

Em linhas:

CH_4	NH_3	H_2O	HF
$\delta^- \quad \delta^+$	$\delta^- \quad \delta^+$	$\delta^- \quad \delta^+$	$\delta^- \quad \delta^+$
$\text{H}_3\text{C}-\text{H}$	$\text{H}_2\text{N}-\text{H}$	$\text{OH}-\text{H}$	$\text{F}-\text{H}$
$K_a = 10^{-48}$	$K_a = 10^{-38}$	$K_a = 10^{-15,7}$	$K_a = 10^{-3,2}$

Aumento da electronegatividade

aumento da acidez

CH_3^-	NH_2^-	OH^-	F^-
-----------------	-----------------	---------------	--------------

carbanião

Aumento da basicidade

Força dos ácidos:

Influência da hibridação na força dos ácidos:

Aumento da força do ácido

Aumento da basicidade dos carbaniões

A estabilidade do carbanião formado é maior no etino porque as orbitais híbridas têm maior carácter "s"

Representação dos mecanismos reacionais

Indica o movimento de eletrões nas reações orgânicas:

A formação e/ou ruptura de ligações envolve o movimento de 1 par de electrões, do centro nucleófilo (ou base) para o centro electrófilo (ou ácido)

As reações envolvem ataques de nucleófilos (bases) a eletrófilos (ácidos):

- ▶ Elementos positivos atacam zonas de carga parcial negativa
- ▶ Reagentes negativos atacam zonas de carga parcial positiva

Representação do caracter ácido:

Representação do caracter básico:

Mecanismo ácido-base:

Mecanismo ácido-base:

Compostos com o grupo carbonilo comportam-se como bases na presença de ácidos fortes:

Eletrófilos e Nucleófilos (:Nu)

Bases de Lewis são **Nucleófilos**

-espécies que cedem eletrões

-extremidade δ^- de uma ligação polarizada

Ácidos de Lewis são **Eletrófilos**

-espécies que captam eletrões

-extremidade δ^+ de uma ligação polarizada

Exemplos de Nucleófilos

Espécie ou uma zona de uma molécula, com uma elevada densidade eletrónica

Numa reação, estes eletrões são cedidos (a um **eletrófilo**) para estabelecer uma ligação covalente

Exemplos de Eletrófilos

Espécie ou uma zona de uma molécula, com um défice de eletrões (baixa densidade eletrónica)

δ^+ , δ^- = slight positive or negative charge

Numa reacção, os **eletrófilos** recebem eletrões (de um **nucleófilo**) para estabelecer uma ligação covalente.

Carbocatiões são eletrófilos

Reações envolvendo eletrófilos e nucleófilos:

É possível que na mesma molécula existam:

- centros (zonas) nucleófilos sujeitos a ataques de eletrófilos
- centros (zonas) eletrófilos sujeitos a ataques de nucleófilos

Ataque nucleófilo:

ataque por uma entidade com excesso de eletrões (procura zonas positivas)

Ataque eletrófilo:

ataque por uma entidade com falta de electrões (que procura eletrões).

Ataque nucleófilo por um carboanião:

Ataque nucleófilo por uma base:

Ataque eletrófilo por um carbocatião:

Em resumo:

Carboaniões e

3 ligações
1 par eletrões
livres

Estrutura
tridimensional
(pirâmide
triangular)

Carboaniões
São nucleófilos
São bases (Lewis)

Carbocatiões:

3 ligações
1 orbital vazia

Estrutura
plana
(triangular)

Carbocatiões
São eletrófilos
São ácidos (Lewis)

Efeito indutor:

A polarização das ligações propaga-se nas moléculas ao longo das ligações existentes

- ▶ Propagação do efeito indutor depende:
 - Comprimento da cadeia → Alcance limitado
 - Natureza dos substituintes → Atrativo / repulsivo
 - Presença de eletrões π deslocalizados → Favorece o efeito indutor
- ▶ Efeito indutor dos grupos substituintes influencia a reatividade e a estabilidade relativa dos iões formados
- ▶ Pode explicar a força dos ácidos orgânicos

Propagação do efeito indutor

Natureza dos substituintes:

Efeito indutor atrativo

F, Cl, Br, I, OH, NH₂.....

Efeito indutor nulo

H

Efeito indutor repulsivo

-CH₃, -C₂H₅, -C(CH₃)₃, metais (ex: Na)

9	18.998	1
F	FLUORINE	
17	35.453	1
Cl	CHLORINE	
35	79.904	3
Br	BROMINE	
53	126.90	5
I	IODINE	
85	(210)	8
At	ASTATINE	

Elementos mais eletronegativos exercem efeito indutor atrativo proporcional à sua eletronegatividade

13	14	15	16	17	18
5	6	7	8	9	10
B	C	N	O	F	Ne
BORON	CARBON	NITROGEN	OXYGEN	FLUORINE	NEON

Propagação do efeito indutor

Comprimento da cadeia:

Intensidade das cargas parciais depende da **distância** da ligação ao elemento polarizador da ligação

O efeito **decrece** com a distância e é praticamente nulo para além de 3 ou 4 ligações

Elementos mais eletropositivos exercem maior efeito indutor repulsivo

Efeito indutor atrativo (do Cl)

Efeito indutor repulsivo (do Na)

PERIOD 1	1 1.0079 H HYDROGEN	2 9.0122 He
2	3 6.941 Li LITHIUM	4 9.0122 Be BERYLLIUM
3	11 22.990 Na SODIUM	12 24.305 Mg MAGNESIUM
4	19 39.098 K POTASSIUM	20 40.078 Ca CALCIUM

Propagação do efeito indutor

Presença de eletrões π deslocalizados:

As ligações π , em ligações duplas e triplas, facilitam a propagação do efeito indutor

- Os eletrões π são mais móveis e são mais polarizáveis que os eletrões das ligações σ

Força dos ácidos:

Ácido clorobutírico

$$K_a = 3,2 \times 10^{-5}$$

Ácido 4-cloro-2-butenol

$$K_a = 126 \times 10^{-5}$$

Ex: influência do efeito indutor na força dos ácidos orgânicos

Ácido acético	CH_3COOH	$K_a = 1,8 \times 10^{-5}$
Ácido cloroacético	ClCH_2COOH	$K_a = 155 \times 10^{-5}$
Ácido propiónico	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	$K_a = 1,6 \times 10^{-5}$
Ácido clorobutírico	$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$	$K_a = 3,2 \times 10^{-5}$
Ácido 4-cloro-2-butenol	$\text{ClCH}_2\text{CH}=\text{CHCOOH}$	$K_a = 126 \times 10^{-5}$

Efeito do Cl?

$K_a = 1,8 \times 10^{-5}$

$K_a = 155 \times 10^{-5}$

$K_a = 1,6 \times 10^{-5}$

$K_a = 3,2 \times 10^{-5}$

$K_a = 126 \times 10^{-5}$

Efeito da ligação dupla?

O efeito indutor determina a **estabilidade relativa** dos iões formados:

Grupos substituintes alquilo apresentam **carácter indutor repulsivo**

- A capacidade indutora repulsiva aumenta com a complexidade do substituinte;
- A carga total do carboanião ou do carbocatião, permanece constante

O efeito indutor determina a estabilidade relativa dos iões formados:

-estabilidade/reactividade dos carboaniões (-)

Substituintes com efeito indutor repulsivo intensificam a carga negativa do carbono, diminuindo a sua estabilidade.

A reatividade aumenta à medida que aumenta o número e a complexidade de grupos substituintes alquilo ligados ao C

- a presença de substituintes com **efeito indutor atrativo atenuam** a carga negativa do carbono, aumentando a sua estabilidade

O efeito indutor determina a estabilidade relativa dos iões formados:

-estabilidade/reatividade dos carbocatiões (+)

Substituintes com efeito indutor repulsivo estabilizam o déficit eletrónico do carbono, aumentando a sua estabilidade.

A reatividade diminui à medida que aumenta o número e a complexidade dos grupos substituintes alquilo ligados ao C

- a presença de substituintes com **efeito indutor atrativo** **acentuam** a carga positiva do carbono, diminuindo a sua estabilidade.

Em resumo:

Grupos substituintes com Efeito indutor atrativo

Efeito indutor nulo

Grupos substituintes com Efeito indutor repulsivo

Menor estabilidade dos carbocatiões

Maior caráter eletrófilo dos carbocatiões

Menor estabilidade dos carboaniões

Maior caráter nucleófilo dos carboaniões

Influência do efeito indutor na estabilidade dos radicais

Os grupos substituintes com efeito **indutor repulsivo** (R) atenuam o déficit eletrónico do carbono do "radical livre"

Maior número de grupos alquilo R dá maior estabilidade do "radical livre"