

Matemática II

Fundamentos de Probabilidade

2014/2015

(MJ Martins, F. Valente e M. Mesquita)

Experiência aleatória

Experiência aleatória:


- O conjunto dos resultados possíveis é conhecido antes da realização da experiência;
- tem intervenção do acaso, por isso o resultado (observação - ω) não se conhece antes da realização da experiência.

▣ **Espaço de resultados (Ω):** o conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória.

2

Variáveis aleatórias

▣ **Variável aleatória (v.a.) X** - é uma função que associa um nº real x a cada resultado ω do espaço de resultados Ω de uma experiência aleatória.



3

Variáveis aleatórias

▣ X é v.a. **discreta** se Ω' é finito ou infinito numerável. Exemplo: nº de crianças que nasce em cada parto, nº de gralhas em cada página de um livro e em geral variáveis de “contagem”.

▣ X é v.a. **contínua** se Ω' é um intervalo ou uma colecção de intervalos da recta real. Exemplo: resultados de “medições” como peso, altura.

4

Variáveis aleatórias

Exemplo – Variáveis aleatórias

X - v.a. que representa o número da face de cima no lançamento de um dado com as faces numeradas de 1 a 6

$$\Omega' = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \text{v.a. discreta}$$

X - v.a. que representa a soma dos números das faces de cima no lançamento de dois dados

$$\Omega' = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\} \quad \text{v.a. discreta}$$

X - v.a. que representa o tempo (em centenas de horas) que uma lâmpada leva a fundir

$$\Omega' = \mathbb{R}_0^+ \quad \text{v.a. contínua}$$

5

Massa de probabilidade de uma v.a. discreta

$$X = \begin{cases} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{cases}$$

$$p_i = P[X = x_i]$$

$$i) \quad p_i \geq 0 \quad i = 1, 2, \dots$$

$$ii) \quad \sum_{i=1} p_i = 1$$


6

Massa de probabilidade de uma v.a. discreta

Exemplo (continuação) – função massa de probabilidade

X – v.a. que representa o número da face de cima no lançamento de um dado

$$X = \begin{cases} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{cases}$$




7

Massa de probabilidade de uma v.a. discreta

X – v.a. que representa a soma dos números das faces de cima no lançamento de dois dados

$$X = \begin{cases} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ \frac{1}{36} & \frac{2}{36} & \frac{3}{36} & \frac{4}{36} & \frac{5}{36} & \frac{6}{36} & \frac{5}{36} & \frac{4}{36} & \frac{3}{36} & \frac{2}{36} & \frac{1}{36} \end{cases}$$

		dado 1					
		1	2	3	4	5	6
dado 2	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12



8

Função densidade

▣ No terceiro exemplo, qual é

$$P[X=5.0000984] ? \quad \text{e} \quad P[X=36] ?$$

▣ Se X é uma v.a. contínua, $P[X=x]=0, \forall x \in \mathbb{R}$


▣ **Função densidade** de uma v.a. contínua,

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$i) f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$ii) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$P[a < X < b] = \int_a^b f(t) dt$$



10

Função distribuição cumulativa

▣ Definição de f.d.c.: $F: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$

$$x \rightarrow F_X(x) = P[X \leq x]$$

– X v.a. discreta

$$F_X(x) = P[X \leq x] = \sum_{x_i \leq x} P[X=x_i]$$

– X v.a. contínua


$$F_X(x) = P[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Função distribuição cumulativa

▣ **Exemplo** (continuação) – f.d.c. v.a. discreta

X – v.a. que representa o número da face de cima

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ \frac{1}{6} & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ \frac{1}{6} + \frac{1}{6} & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ \vdots & \\ 6 \times \frac{1}{6} = 1 & \text{se } x \geq 6 \end{cases}$$



11

Função distribuição cumulativa

▣ **Exemplo** (continuação) – v.a. contínua


X – tempo (em centenas de horas) que uma lâmpada leva a fundir

função densidade

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ 0.1 e^{-0.1x} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

função distribuição cumulativa

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ 1 - e^{-0.1x} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$



12

Função distribuição cumulativa

Propriedades da f.d.c.:

- é crescente
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- é contínua à direita
- se X é v.a. discreta, F_X é uma função com descontinuidades e em escada
- se X é v.a. contínua, F_X é uma função contínua

Exemplos de cálculos de probabilidades a partir de F :

$$\begin{aligned}
 P[X \leq a] &= F(a) & P[X > a] &= 1 - F(a) \\
 P[X < a] &= F(a^-) = \lim_{x \rightarrow a^-} F(x) & P[X = a] &= F(a) - F(a^-) \\
 P[a < X \leq b] &= P[X \leq b] - P[X \leq a] = F(b) - F(a) \\
 P[a < X < b] &= P[X < b] - P[X \leq a] = F(b^-) - F(a)
 \end{aligned}$$

13

Parâmetros de uma variável aleatória

Valor médio ou valor esperado de X – é o ponto de equilíbrio dos valores possíveis para X

$$\begin{array}{ll}
 X \text{ v.a. discreta} & X \text{ v.a. contínua} \\
 \mu = E[X] = \sum_{i=1} x_i p_i & \mu = E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx
 \end{array}$$

(média ponderada dos valores de X)

Valor médio ou valor esperado de uma função de X , $\phi(X)$

$$\begin{array}{ll}
 X \text{ v.a. discreta} & X \text{ v.a. contínua} \\
 E[\phi(X)] = \sum_{i=1} \phi(x_i) p_i & E[\phi(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) f(x) dx
 \end{array}$$

14

Propriedades do valor médio

Sejam a e b constantes e φ e ψ duas funções,

- 1) $E[a] = a$
- 2) $E[a + bX] = a + bE[X]$
- 3) $E[\varphi(X) + \psi(X)] = E[\varphi(X)] + E[\psi(X)]$
- 4) Se $X \geq 0$ então $E[X] \geq 0$

15

Parâmetros de uma variável aleatória

Variância de X – mede a dispersão dos valores de X em torno do valor esperado

$$Var(X) = \sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - \mu^2$$

Desvio padrão de X

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)}$$

Quantil de ordem p de X ($0 < p < 1$), χ_p

é o menor valor de x tal que $F(x) \geq p$.

- Se $p = 0.5$, $\chi_{0.5}$ é a **mediana** de X .
- Em distribuições contínuas, χ_p é o menor valor de x que verifica $F(x) = p$.

16

Propriedades da variância e do desvio padrão


Sejam a e b constantes,

- 1) $Var[X] \geq 0$
- 2) $Var[a + bX] = b^2 Var[X]$
- 3) $\sigma_{a+bX} = |b| \sigma_X$

17

Pares aleatórios

Permite estudar relações entre duas características numéricas associadas a cada elemento do espaço de resultados de uma experiência aleatória.



Exemplo: altura e diâmetro (a 1.3m do solo) das árvores de uma região.

18

Pares aleatórios discretos

- ▣ Pares aleatórios discretos – **distribuição de probabilidade conjunta**

$$p_{ij} = P[X = x_i, Y = y_j] \quad i=1,2,\dots \quad j=1,2,\dots$$

tal que $p_{ij} \geq 0$ e $\sum_{i=1} \sum_{j=1} p_{ij} = 1$

- ▣ Distribuições **marginais**:

$$p_{i.} = P[X = x_i] = \sum_{j=1} p_{ij}$$

$$p_{.j} = P[Y = y_j] = \sum_{i=1} p_{ij}$$

19

Pares aleatórios discretos: independência

- ▣ Seja (X, Y) um par aleatório discreto. As v.a.s X e Y são **independentes** se e só se

$$p_{ij} = p_{i.} p_{.j}, \quad \forall i, j$$

- ▣ Exemplos:

$X \setminus Y$	3	4	$p_{i.}$
1	0.2	0.2	0.4
2	0.3	0.3	0.6
$p_{.j}$	0.5	0.5	1.0

X e Y são v.a. independentes

$X \setminus Y$	3	4	$p_{i.}$
1	0.1	0.3	0.4
2	0.4	0.2	0.6
$p_{.j}$	0.5	0.5	1.0

X e Y não são v.a. independentes

20

Parâmetros de um par aleatório (discreto ou contínuo)

- ▣ **Valor médio** ou **valor esperado** de uma função de X e de Y , $\psi(X, Y)$:

– (X, Y) par aleatório **discreto** $E[\psi(X, Y)] = \sum_{i=1} \sum_{j=1} \psi(x_i, y_j) p_{ij}$

– (X, Y) par aleatório **contínuo**
(o cálculo do valor deste parâmetro sai fora do âmbito desta UC)

$$E[\psi(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, y) f(x, y) dx dy$$

em que $f(x, y)$ é a função densidade conjunta do par.

- ▣ Propriedades:

- $E[X \pm Y] = E[X] \pm E[Y]$

- Se X e Y são v.a. **independentes** então

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

21

Parâmetros de um par aleatório

- ▣ **Covariância** de X e Y

$$Cov(X, Y) = \sigma_{X,Y} = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - \mu_X \mu_Y$$

- ▣ Propriedades:

- $Cov(a + bX, c + dY) = bdCov(X, Y)$

- $Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y) \pm 2Cov(X, Y)$

- Se X e Y são v.a. **independentes** então

$$Cov(X, Y) = 0$$

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$$

Nota: $Cov(X, Y) = 0$ **não implica** que X e Y são v.a. independentes.

22

Parâmetros de um par aleatório

- ▣ **Coefficiente de Correlação** entre X e Y

$$\rho_{X,Y} = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad \sigma_X \neq 0, \quad \sigma_Y \neq 0$$

- ▣ Propriedades:

- $-1 \leq \rho_{X,Y} \leq 1$

- $\rho_{a+bX, c+dY} = \begin{cases} \rho_{X,Y} & \text{se } bd > 0 \\ -\rho_{X,Y} & \text{se } bd < 0 \end{cases}$

- Se X e Y são v.a. **independentes** então $\rho_{X,Y} = 0$

23

Bibliografia

- ▣ Murteira, B., Ribeiro, C.S., Silva, J.A. e Pimenta C. (2010). Introdução à Estatística. Escolar Editora.
- ▣ Neves, M. (2009) Introdução à Estatística e Probabilidade. Apontamentos de apoio às aulas.
– Teoria da Probabilidade: www.isa.utl.pt/dm/estat/estat/seb2.pdf
- ▣ Pestana, D.D. e Velosa, S.F. (2002) Introdução à Probabilidade e à Estatística, vol.I, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

24